GRANGER MEDICAL CLINIC

David H. Oelsner, MD
consultorio 801.965.3698

Instrucciones del paciente para la colonoscopia

Actualmente su colonoscopia está programada para el _____, en la siguiente ubicación:

Northpointe Surgical Center
2326 N. 400 E.
Bldg. C, Ste. 100
Tooele, UT 84074
435.843.0180

Alta View Hospital
Outpatient Specialty Center
9450 S. 1300 E.
Sandy, UT 84094
801.501.6488

Utah Surgical Center
3715 W. 4100 S.
West Valley City, UT 84120
801.957.0200
Llame al centro para preguntar la hora.

Riverton Hospital
3741 W. 12600 S.
Riverton, UT 84065
801.285.2775

El centro se comunicará con usted el día antes para verificar su hora de llegada.
Si su colonoscopia está programada para un lunes, se comunicarán con usted el viernes anterior.

RECETA MÉDICA INCLUIDA RECETA MÉDICA ENVIADA A LA FARMACIA

Llame al 801.965.3698 si necesita cancelar o volver a programar su colonoscopia.
Las cancelaciones *deben* hacerse con 5 días de anticipación para evitar que se le haga un cobro por no presentarse.

****SIGA POR COMPLETO ESTAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN****
Es imprescindible que siga estas instrucciones para evitar que se vuelva a programar su procedimiento.

El día antes de su procedimiento:

Beba **solamente líquidos transparentes** para el desayuno, almuerzo y cena (TODO EL DÍA). La hidratación es muy importante; entre más líquidos transparentes beba, mejor será su preparación.

Por la noche, mezcle el **PLENVU** (sobre de dosis 1) como se indica en el costado de la caja. Beba las 16 onzas de solución a **las 6 p. m**. Debe beber por lo menos 16 onzas de agua durante los próximos 30 minutos. Continúe bebiendo líquidos transparentes hasta la hora de acostarse.

Tome 2 tabletas de GAS-X la noche anterior a su procedimiento para ayudar a que la preparación funcione mejor.

La mañana de su procedimiento:

Por lo menos 4 horas antes de su procedimiento, beba la segunda solución de 16 onzas de **PLENVU** (dosis 2, sobre de mezcla A y B) como se indica en el costado de la caja (por ejemplo, si su procedimiento es a las 9 a. m., comience a beber PLENVU a las 5 a. m.). Luego beba por lo menos 16 onzas de agua durante los próximos 30 minutos. Continúe bebiendo más líquidos transparentes. **DEJE** de **beber todos los líquidos 3 horas antes de su procedimiento.**

Líquidos transparentes permitidos: Cualquier líquido que pueda ver a través del líquido. Estos incluyen agua, jugos de frutas transparentes (por ejemplo, manzana, jugo de uva blanca), caldo de cualquier sabor, gelatina de cualquier color, bebidas gaseosas, café negro puro (SIN crema), Gatorade o Powerade. NO CONSUMIR ALIMENTOS SÓLIDOS O PRODUCTOS LÁCTEOS EN TODO EL DÍA. Evite líquidos de color ROJO.

¡Recibirá sedación intravenosa (IV) y **DEBE** tener alguien que **FIRME SU SALIDA y LO LLEVE a casa!**

Puede continuar tomando su aspirina de baja dosis. Asegúrese de preguntar acerca de otros medicamentos anticoagulantes, ya que es posible que deba suspenderlos 5 días antes de su procedimiento.

Uno de nuestros Asesores de Beneficios del Paciente se comunicará con usted antes de su colonoscopia para revisar los deducibles y costos de su propio bolsillo