GRANGER MEDICAL CLINIC

Instrucciones de preparación del paciente para la endoscopía con cápsula CapsoCam Plus

NOTA: Si está tomando un suplemento de hierro por vía oral, interrumpa la toma 4 días completos antes del examen, al igual que los medicamentos analgésicos.

Día anterior al procedimiento:

Tome el desayuno seguido de un almuerzo liviano. Luego, haga dieta líquida por el resto del día y la noche antes del procedimiento (no beber nada rojo).

- Tome una (1) dosis del paquete de 17 gramos de MiraLAX NeatPAX con un vaso lleno de agua o Gatorade (que no sea de color rojo) a las 9:30 p. m. o al acostarse.
- No beba nada después de las 10 p. m. (está permitido beber pequeños sorbos de agua con los medicamentos).

Día del procedimiento:

- No consuma medicamentos hasta 2 horas después de ingerir la cápsula, a menos que su médico lo considere necesario. En ese caso, beba pequeños sorbos de agua con los medicamentos.
- Dos (2) horas antes del horario programado para ingerir la cápsula, tome una (1) dosis del paquete de 17 gramos de MiraLAX NeatPAX con un vaso lleno de agua o Gatorade (que no sea de color rojo).
- Preséntese en el consultorio a las _____ a. m./p. m. el día _____ .
- Retome la ingesta de líquidos claros 2 horas después de ingerir la cápsula: _____ a. m./p. m.
- Tome una (1) dosis del paquete de 17 gramos de MiraLAX NeatPAX con un vaso lleno de agua o Gatorade (que no sea de color rojo) cuatro
  (4) horas después de ingerir la cápsula.
- Coma un almuerzo liviano cuando se sienta listo después de su última dosis de MiraLAX NeatPAX.
- Registre lo que ingiere en el almuerzo _____ .

Información importante para el paciente:

- Siguiendo estrictamente las instrucciones antes mencionadas, la cápsula tardará normalmente entre 8 y 48 horas en eliminarse, en caso de movimientos intestinales regulares. Si la cápsula no se ha eliminado luego de las 72 horas de ingerirla, contacte a su médico.
- Respete las instrucciones para la recuperación de la cápsula y devuélvala al consultorio cuando les resulte conveniente a usted y al personal del consultorio.
- Visite http://www.capsovision.com/products/capsoretrieve para ver el video de la recuperación si lo desea.
- Para evitar tener que repetir el estudio, siga las instrucciones para la recuperación hasta que haya obtenido la cápsula. Use el colador proporcionado hasta la recuperación.

Devolución de la cápsula:

- Se le proporcionará un Clinical Pak de Fed-Ex etiquetado junto con el kit que se llevará a su casa. Coloque el vial con la cápsula en el Clinical Pak de Fed-Ex, séllelo y llame a Fed-Ex para que lo retiren o deposítelo en un buzón de Fed-ex o entréguelo en una de sus oficinas.

Si tiene preguntas, contáctese con el consultorio llamando al
801.965.3698